Drontal® plus

BAYER

Vermicida
Giardicida

Uso Veterinário

para cães

COMPOSIÇÃO
Cada comprimido contém:

Comprimidos para tratar 10 kg de peso:
Praziquantel.....50 mg
Pamoato de pirantel.....144 mg
Febantel.....150 mg
Excipiente q.s.p.....660 mg

Comprimidos para tratar 35 kg de peso:
Praziquantel.....175 mg
Pamoato de pirantel.....504 mg
Febantel.....525 mg
Excipiente q.s.p.....2.310 mg

INDICAÇÕES
Drontal® Plus é especialmente indicado para o tratamento e controle das verminoses intestinais e da giardíase em cães, apresentando excelente atividade contra os seguintes parasitos:

Cestóides (vermes chatos):
- *Taenia multiceps*
- *Taenia pisiformis*
- *Dipylidium caninum*
- *Taenia ovis*
- *Echinococcus granulosus*
- *Taenia taeniaeformis*
- *Echinococcus multilocularis*
- *Joyeuxiella pasqualei*
- *Mesocestoides* spp.
- *Taenia hydatigena*

Nematódeos (vermes redondos):
- *Ancylostoma braziliense*
- *Ancylostoma caninum*
- *Toxocara canis*
- *Toxascaris leonina*
- *Trichuris vulpis*
- *Uncinaria stenocephala*

Protozoários:
- *Giardia* spp.

MODO DE USAR E DOSAGENS
Verifique o peso de seu cão a fim de calcular a dose correta para o tratamento.

O esquema abaixo fornece as doses recomendadas para as diferentes faixas de peso dos cães:

Comprimidos de 660 mg: 1 comprimido trata 10 kg de peso, conforme tabela abaixo:

Peso do animal	Dosagem
Cães até 2,0 kg	1/4 de comprimido
de 2,1 a 5 kg	1/2 comprimido
de 5,1 a 10 kg	1 comprimido

Comprimidos de 2.310 mg: 1 comprimido trata 35 kg de peso, conforme tabela abaixo:

Peso do animal	Dosagem
Cães de 15 a 17,5 kg	1/2 comprimido
de 17,6 a 35 kg	1 comprimido

Os comprimidos podem ser fracionados e/ou conjugados para tratar os animais de forma prática, com dosagens mais precisas, por exemplo:

Peso do animal	Dosagem
Cães de 45 kg	1 comprimido de 660 mg + 1 comprimido de 2.310 mg

Para o tratamento das verminoses intestinais, Drontal® Plus deve ser administrado por via oral em dose única.

Contra a giardíase, administrar o produto na dosagem recomendada, uma vez por dia, durante três dias consecutivos.

Os comprimidos podem ser misturados à ração ou à carne, sendo muito bem tolerados e dispensando regime especial ou jejum prévio.

Se a dosagem utilizada for inferior a 1 comprimido, o restante deste comprimido pode ser armazenado no blíster aberto por até 1 mês. Após este período deve ser descartado.

Os comprimidos que permanecerem fechados no blíster podem ser utilizados normalmente dentro do prazo de validade.

RECOMENDAÇÕES
Uma única dose de **Drontal® Plus** elimina os cestóides e nematódeos presentes no intestino do cão. Porém, as larvas de nematódeos que estejam migrando pelo organismo do animal chegarão ao intestino em diferentes intervalos de tempo, peculiares a cada espécie de verme, estabelecendo uma nova infestação.Somam-se a elas as larvas e ovos adquiridos do ambiente contaminado. Assim sendo, faz-se necessário repetir o tratamento após um determinado tempo, de acordo com o período pré-patente do verme diagnosticado, que deve ser avaliado pelo médico veterinário com base na espécie de verme, no ambiente e no manejo do cão.

Para prevenir reinfestações por *Dipylidium caninum*, deve-se tratar de forma integrada o cão e o ambiente, a fim de controlar as pulgas, hospedeiras intermediárias deste verme chato.

Cada *Ancylostoma caninum* adulto ingere cerca de 0,1mL de sangue por dia, e infestações severas costumam ser fatais para os filhotes. As larvas desse verme passam da glândula mamária ao leite, penetram ativamente pela pele ou são ingeridas a partir do ambiente contaminado. Já o *Toxocara canis* infesta os filhotes atravessando a barreira placentária, chegando ao leite através da glândula mamária; ou pela ingestão dos ovos. A cadela pode eventualmente adquirir o verme ingerindo aves ou roedores.

Larvas desses dois últimos vermes permanecem inativas na musculatura da cadela, produzindo infestações por diversas crias consecutivas. Por esta razão, recomenda-se o tratamento da fêmea antes da cobertura e 10 dias antes do parto. Os filhotes podem ser tratados durante a lactação e após o desmame, com 2, 4, 8 e 12 semanas, e aos 4, 5 e 6 meses. Deve-se vermifugar a cadela ao mesmo tempo que a ninhada. Os cães adultos podem ser vermifugados a cada três meses. Junto com a vermifugação deve ser feita uma limpeza rigorosa do ambiente, com produtos à base de cloro ativo, efetivo contra larvas e ovos dos vermes.

Os cestóides e os nematódeos dos cães representam também um sério risco para humanos.

Para o controle da giardíase é importante oferecer aos cães água clorada e filtrada, trocando-a várias vezes ao dia. Lavar diariamente os bebedouros e desinfetar o ambiente com produtos à base de amônia quaternária, porque os cistos de *Giardia* spp. sobrevivem no ambiente e são uma fonte de reinfestação para os cães.

A remoção imediata das fezes do cão limita a contaminação do ambiente por vermes e protozoários.

Consulte o médico veterinário para adequar o tratamento com **Drontal® Plus** a cada situação particular.

CONTRAINDICAÇÕES
Não administrar **Drontal® Plus** para gatos.

REAÇÕES ADVERSAS
Os estudos de toxicidade sobre este produto indicam uma ampla margem de segurança para cães, sem contraindicações ou efeitos colaterais, podendo inclusive ser utilizado durante a gestação e lactação, conforme esquema de tratamento proposto. Após o tratamento, animais altamente infestados por vermes podem apresentar vômitos, diarreias e apatia, causados pela morte e desintegração destes parasitos no intestino do cão. A presença de vermes inteiros ou fragmentos de vermes nas fezes do cão tratado é indicativo de grandes cargas parasitárias.

Conservar em local seco e fresco, em temperatura ambiente (15ºC a 30ºC), ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição do médico veterinário.

LEVE SEU CÃO REGULARMENTE AO VETERINÁRIO

APRESENTAÇÃO
Cartuchos com blíster contendo dois ou quatro comprimidos de 660 mg cada um e cartuchos com blíster contendo dois comprimidos de 2.310 mg cada um.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 3047, em 22/09/88

Proprietário: **Bayer S.A.**
Rua Domingos Jorge, 1100 - São Paulo - SP
CNPJ 18.459.628/0001-15

Responsável técnico:
Léa B. H. Lucas
CRMV-SP 8290

Fabricante: Althaia S.A.
Av. Engº Heitor Antonio Eiras Garcia, 2756
São Paulo - SP
CNPJ 48.344.725/0001-23

Indústria brasileira

TELEBAYER
0800 701 55 46
bayerpet.com.br

Bayer

82257314

ESTE TEXTO É PROIBIDA A REPRODUÇÃO DA BULA